
Registran 138 muertes por fiebre amarilla en Angola

12/03/2016



La nota indica que el balance se hizo el día 8 y el número total de casos confirmados de contagio con la dolencia es de 65, de 813 sospechosos de infección.

Precisa que el epicentro de la epidemia continúa localizado en Viana sin evidencias de transmisión local en otras áreas.

Desde que comenzó la campaña contra la fiebre amarilla el 2 de febrero fueron inmunizadas cuatro millones 881 mil 839 personas de los seis millones 434 mil 316 previstas para ser vacunadas en la provincia de Luanda.

Las provincias de Benguela, Bie, Cabinda, Cunene, Cuanza Sur, Huambo y Huila también notificaron casos, todos vinculados de manera epidemiológica con Luanda.

El primer caso de la enfermedad en Angola se detectó el 5 de diciembre en un ciudadano de Eritrea, en Viana. La megacampaña de combate al padecimiento abarca acciones de sensibilización en las poblaciones para reforzar medidas de prevención como tapar los recipientes de agua, colocar óleo quemado en charcos y protegerse contra las picadas de mosquitos.

Aparece también entre las acciones la distribución de minidosis de Bactivec (desinfectante para agua), tratamientos contra criaderos de larvas de mosquito, fumigación intra y extra domiciliaria, así como la vacunación.

La fiebre amarilla es una dolencia viral transmitida por mosquitos infectados y provoca fiebre, dolores musculares, pérdida de apetito, vómitos y náuseas que pueden conducir a la muerte.